

La Natura non crea sfigati!

Nuova Medicina Germanica® e 5 Leggi Biologiche

Tabella di consultazione - Mesencefalo

In questa tabella è presente un estratto del poster sulle relazioni psiche-cervello-organo del Dottor Hamer. In questo documento si tratta del solo foglietto endodermico nella sua sezione mesencefalica.

Gli **SBS** delle strutture di derivazione mesencefalica riconoscono conflitti legati alla funzionalità propria dei tessuti derivati.

La fase di Conflitto Attivo (CA) è scarsamente sintomatica e prevede un aumento del tessuto muscolare liscio, mentre la fase di Post-ConflittoLisi (PCL) è quella dove si manifestano i sintomi, caratterizzati da iperperistaltismo.

| Sinistra del corpo | | | | Destra del corpo | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|
| Organo/ Tessuto | Conflitto | Andamento | "Malattie" | Organo/ Tessuto | Conflitto | Andamento | "Malattie" |
| 1 Gb sn Muscolatura liscia intestinale espellente sn | Non poter far avanzare il boccone nell'intestino | In fase CA iperperistalsi localizzata e atonia intestinale restante, per favorire la progressione del boccone In fase PCL ipermotilità intestinale globale | Ileo paralitico, coliche addominali | 1 Gb dx Muscolatura liscia intestinale emittente dx | Non poter far avanzare il boccone nell'intestino | In fase CA iperperistalsi localizzata e atonia intestinale restante, per favorire la progressione del boccone In fase PCL ipermotilità intestinale globale | Ileo paralitico, coliche addominali |

Senso biologico: In fase CA per poter spingere in avanti il boccone con più efficacia

| | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|---|--|--|------------------------|
| 2 Gb sn Muscolo uterino emiparte sn | Conflitto di annidamento del feto all'interno dell'utero | In fase CA si ha aumento del tono muscolare per favorire il trattenimento del feto all'interno dell'utero In fase PCL si ha rilassamento muscolare. Nella fase della crisi epiletticoide, tornano forti contrazioni | Mioma uterino a sinistra | 2 Gb dx Muscolo uterino emiparte dx | Conflitto di annidamento del feto all'interno dell'utero | In fase CA si ha aumento del tono muscolare per favorire il trattenimento del feto all'interno dell'utero In fase PCL si ha rilassamento muscolare. Nella fase della crisi epiletticoide, tornano forti contrazioni | Mioma uterino a destra |
|---|--|--|--------------------------|---|--|--|------------------------|

Senso biologico: In fase CA per favorire il trattenimento del feto in cavità uterina

| | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|--|--|---|-----------------------|
| 3 Gb sn Muscolatura cardiaca liscia dx Eccezione Data la torsione del tubo cardiaco a sinistra corrisponde l'atrio destro | Non poter far circolare abbastanza sangue. Il sangue non progredisce a sufficienza | In fase CA aumenta la peristalsi del muscolo atriale Anche nella fase PCL la peristalsi muscolare rimane aumentata | Fibrillazione atriale | 3 Gb dx Muscolatura cardiaca liscia sn Eccezione Data la torsione del tubo cardiaco a destra corrisponde l'atrio sinistro | Non poter far circolare abbastanza sangue. Il sangue non progredisce a sufficienza | In fase CA aumenta la peristalsi del muscolo atriale Anche nella fase PCL la peristalsi muscolare rimane aumentata | Fibrillazione atriale |
|--|--|---|-----------------------|--|--|---|-----------------------|

Senso biologico: In fase CA per favorire la circolazione più efficiente del sangue

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------|
| 4 Gb sn Muscolatura liscia dei vasi sanguigni sn arterie e vene | Dover rinforzare la parete vascolare | In fase CA ispessimento della tonaca muscolare dei vasi in concomitanza con la necrosi della parete vascolare In fase PCL la parete muscolare liscia rimane ispessita | Aneurismi, varicosità | 4 Gb dx Muscolatura liscia dei vasi sanguigni dx arterie e vene | Dover rinforzare la parete vascolare | In fase CA ispessimento della tonaca muscolare dei vasi in concomitanza con la necrosi della parete vascolare In fase PCL la parete muscolare liscia rimane ispessita | Aneurismi, varicosità |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------|

Senso biologico: In fase CA per favorire la migliore perfusione sanguigna



La Natura non crea sfigati

Testo divulgativo che tratta della Medicina di Hamer, la famosa e assurdamamente contestata Medicina Biologica. Il potere della Natura di mantenere in vita i propri figli, svelato in un'opera leggera, breve, chiara ed alla portata di tutti.

[Acquista >](#)